


Clinique pour les enfants spécialisée en MGF/Excision :

Prévention, soins, protection, aspects médico-légaux



Deborah Hodes, Pédiatre communautaire et consultante

University College London Hospitals, Royaume-Uni

Aperçu

- Contexte et types de MGF
- Prévalence dans le monde et au Royaume-Uni
- Expérience à la clinique pour enfants à Londres
- Prévention et poursuite au Royaume-Uni

NEWS[Home](#) | [UK](#) | [World](#) | [Business](#) | [Politics](#) | [Tech](#) | [Science](#) | [Health](#)[England](#) | [Regions](#)**Charity warns of FGM 'part
place in England****The Telegraph****FGM affects 137,000 women in :
reveals shocking new study**

A new study - published today, ahead of the UK's first Girl Summit - shows a significant increase in the number of girls and women undergoing female genital mutilation and forced marriage. Radhika Sanghani reports

[News](#) > [Politics](#)**Make lessons on FGM compulsory, say
doctors****EveningStandard.****THE TIMES****Thousands more FGM sufferers
are uncovered by pregnancy
screening****NEWS**[Home](#) | [UK](#) | [World](#) | [Business](#) | [Politics](#) | [Tech](#) | [Science](#) | [Health](#) | [Ed](#)[UK](#) | [England](#) | [N. Ireland](#) | [Scotland](#) | [Alba](#) | [Wales](#) | [Cymru](#)**Failure to stop FGM is a 'national
scandal', say MPs**[jobs](#) | [dating](#) | [more](#) ▾ | [UK edition](#) ▾**theguardian**
website of the year**Anti-FGM campaign launched in UK to
mark global day of opposition**

Aperçu

- Contexte et types de MGF
- Prévalence dans le monde et au Royaume-Uni
- Expérience à la clinique pour enfants à Londres
- Prévention et poursuite au Royaume-Uni

MGF : Définition de l'OMS

Les mutilations sexuelles féminines recouvrent toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales.

(OMS 2016)

Violence envers les femmes et les filles

Une approche fondée sur les droits

Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies (1989) :


► Article 24


« Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. »

► Article 19

« ... protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation... »


Types de MGF






OMS : Type 4


UNICEF : « couper et retirer des morceaux de chair »



OMS Type I




OMS Type 2



UNICEF : « morceaux de chair retirés »

Infibulation



OMS : Type 3

UNICEF : « suture des parties génitales »

Complications : immédiates

- Douleur
- Hémorragie
- Infection
- Blessure à d'autres organes causant des fistules
- Rétention urinaire en raison de la douleur et de l'enflure
- Mort

Complications : long terme

- Ne guérit pas
- Abscesses récurrents, kystes dermoïdes/inclusion, chéloïde
- Infections urinaires récidivantes
- Infections transmises par le sang
- Gynécologiques
- Obstétricales
- Psychologiques – TSPT

Croyances et idées fausses

- Obligation sociale/acceptation/rite de passage
- Réduction du désir sexuel, peur du clitoris et de la sexualité, maintien de la virginité
- Exigence religieuse
- Préparation pour le mariage et l'âge adulte
- Purification du corps, apparence
- Protection contre les envies matérielles

Influences UNICEF 2013

Facteurs de protection


- Discuter avec le mari/l'ami
- Savoir que la loi a été ou sera mise en œuvre
- TV, médias, débat mondial
- Attitude des hommes et connaissances
- Connaître une femme non excisée

Facteurs de risque

- Mère ou sœur excisée
- Mère isolée
- Influence de la grand-mère
- Peu d'information et de discussions entourant la MGF
- Les collectivités ont l'impression de ne pas être prises au sérieux par le secteur officiel

Périodes où le risque de MGF est le plus élevé

Dans 50 % des cas, la MGF est réalisée avant l'âge de cinq ans



La loi du Royaume-Uni

1985 Female Circumcision Prohibition Act (loi de 1985 interdisant la circoncision féminine)

- Il est interdit à un résident national ou permanent du Royaume-Uni de mutiler la totalité ou toute partie des organes génitaux d'une fille ou d'une femme
- Ou d'aider, d'encourager, de conseiller ou de faciliter l'intervention de MGF au Royaume-Uni



2003 Female Circumcision Prohibition Act (loi de 2003 interdisant les mutilations génitales féminines)

- La loi interdit de prévoir une MGF à l'étranger, même dans les pays où cette pratique peut être légale



La loi



2015 Serious Crime Act (loi de 2015 sur les crimes graves) :

- Signalement obligatoire à la police des femmes de moins de 18 ans ayant subi une MGF
- Ordonnance de protection contre la MGF
- Omission de protéger une fille contre les MGF
- Anonymat des victimes de MGF au cours de la vie

Aperçu


- Contexte et types de MGF
- Prévalence dans le monde et au Royaume-Uni
- Expérience à la clinique pour enfants à Londres
- Prévention et poursuite au Royaume-Uni

Prévalence de la MGF

Mise à l'échelle 2011

200 millions de
femmes et de filles
dans le monde

UNICEF 2016



- Essentially never
- Rare or limited to particular ethnic minority enclaves (<11%)
- 11-25% of women have had their genitals cut
- 26-50% of women have had their genitals cut
- More than half of women have had their genitals cut
- No Data

(This scale includes both mild and severe forms of cutting.)

Prévalence estimée de la MGF en Angleterre et au pays de Galles

Equality Now et City University 2014

Données de 2011 publiées par l'Office of National Statistics Census concernant le nombre de migrants nés dans des pays où la MGF est pratiquée et où les taux de MGF sont connus

Plus de 15 ans :

- Nombre total de survivantes d'une MGF : 127 000

Moins de 15 ans :

- 10 000 sont nées à l'extérieur du Royaume-Uni et sont susceptibles d'avoir subi une MGF avant leur entrée au Royaume-Uni
- 60 000 sont nées au Royaume-Uni de femmes issues de pays pratiquant la MGF, et sont donc considérées comme étant à risque
- Les chiffres pourraient être sous-estimés
- Aucune information sur la poursuite de la pratique suivant la migration au Royaume-Uni

Signalement obligatoire en 2015

Signaler qu'elles ont subi une MGF – utiliser la terminologie

- Couper
- Circoncision
- Sunna

Signes et symptômes de la MGF

- Si vous n'avez pas de raison de croire que c'était pour des motifs de santé physique ou mentale de la fille ou à des fins liées au travail ou à l'accouchement
- Comprend les perçages ou tatouages au niveau des organes génitaux pour des raisons non médicales

Ensemble de données de MGF amélioré pour 2016-2017 – Ministère de la Santé

- **5 391** nouveaux cas signalés de MGF
- 87 % des cas visaient des femmes enceintes
- 139 cas (2,6 %) visaient des femmes de moins de 18 ans
- 57 cas (1 %) signalés ont été observés au Royaume-Uni, et des données étaient disponibles pour 50 de ces cas qui visaient tous des perçages au niveau des organes génitaux

Étude de la British Paediatric Surveillance Unit

SIGNALEMENT DE CAS par des pédiatres pour la période 2015-2017

Nombre total de signalements	138
Exclus	25
Doublons	6
Cas confirmés	96
En attente de données/d'un examen	9
Incapable de faire un suivi	2

Aperçu

- Contexte et types de MGF
- Prévalence dans le monde et au Royaume-Uni
- **Expérience à la clinique pour enfants à Londres**
- Prévention et poursuite au Royaume-Uni

Clinique pédiatrique spécialisée en MGF

- Établie en septembre 2014 à la suite d'une hausse des aiguillages
- Personnel clinique
 - Pédiatre consultante
 - Gynécologue consultante
 - Psychothérapeute pour enfants
 - Spécialiste du jeu
 - Infirmière clinicienne spécialisée (ICS)



Consultation

- Rencontrer l'enfant (thérapeute spécialiste du jeu/ICS)
- Discuter avec la police/les travailleurs sociaux
- Rencontrer les parents/tuteurs (+/-enfant)
- Examen avec consentement et colposcope
- Constatations et prochaines étapes expliquées à l'enfant et à la famille
- Discussion plus approfondie avec la psychothérapeute offerte à tous
- Dépistage des virus transmissibles par le sang offert à tous les enfants
- Rapports, le cas échéant



The Child's Journey


- Livre d'images avec la spécialiste du jeu



PARCOURS – PHOTOS – FILLES




Chronologie sur dix ans de la clinique



Aiguillages

162 enfants aiguillés vers la clinique


Nov. 2006 à déc. 2017



Enfants avec MGF (n=75)

- Âge moyen pour la MGF : 5 ans (4 semaines à 17 ans)
- Présentation à la clinique, âge moyen : 9,5 ans (va de 22 semaines à 17 ans)
- 64 (85 %) avaient subi une MGF avant d'arriver au Royaume-Uni
- 11 (15 %) avaient subi une MGF, illégale en vertu de la loi du Royaume-Uni/de l'Irlande

Classification de la MGF (n=75)



Cas 1

- Malaisienne de 30 ans, résidente permanente du Royaume-Uni, rendez-vous prénatal avec la sage-femme
- Mère a confirmé que sa fille et sa petite-fille de 4 ans avaient subi une circoncision
- La fillette de 4 ans a été vue à la clinique

Résultat du cas 1

- Anatomie normale, confirmant le type 4
- Les deux parents étaient bouleversés, étant des citoyens très respectueux des lois; ils ont été horrifiés d'apprendre qu'ils pouvaient avoir commis un acte illégal envers leur fille de 4 ans.



En 2012, on demandait avec instance à tous les parents que leurs bébés filles subissent une circoncision en Malaisie.

Cas 2

- Une mère et ses quatre filles ont été dirigées vers la clinique pour confirmer la MGF chez les trois filles plus âgées nouvellement arrivées au Royaume-Uni depuis la Somalie. La visite visait aussi à s'assurer que la fille la plus jeune (âgée de 7 ans) n'avait pas subi une MGF au Royaume-Uni.

Résultat du cas 2

La fille de 17 ans a subi une MGF à 12 ans.

- Symptômes d'un faible jet d'urine
- Désinfibulation refusée

Les jumelles de 12 ans avaient une petite cicatrice (type 4) sur le gland du clitoris et aucun changement anatomique.

- Après l'explication des résultats, elle a demandé « Alors, suis-je normale? »

Examen normal de la fillette de 7 ans.

Cas 3

- Famille asiatique du Kenya aiguillée par les services sociaux.
- Un membre anonyme du public craignait que leur fille ait subi une MGF.
- Enquête complète des services sociaux

Résultat

- Communauté ne pratiquant pas la MGF (communauté indienne, hindoue) et aucune preuve de MGF lors de l'examen; aucun signalement effectué

Cas 4

- Une adolescente a été informée de la MGF à l'école et s'est présentée à la clinique après avoir dit à son enseignante qu'elle avait subi une MGF avant d'arriver au Royaume-Uni.
- Elle voulait qu'on lui explique son anatomie.
- Plus tard, elle s'est rendue avec sa sœur à la clinique pour obtenir des explications.

Ce que nous avons appris

Conclusions cliniques

- Preuve de médicalisation importante
- Interventions de MGF à un jeune âge
- Proportion importante de type 4 qui peut être difficile à identifier

Autres constatations

- Parents désireux que leur fille se fasse examiner, surtout s'ils affirment que celle-ci n'a pas subi de MGF
- Impact psychologique important de l'aiguillage sur les parents
- Prise en charge multidisciplinaire essentielle au travail des pédiatres lié à la MGF
- Rapports anonymes
- Difficultés à entreprendre des poursuites au Royaume-Uni et dans l'ensemble de l'Union européenne

Aperçu

- Contexte et types de MGF
- Prévalence dans le monde et au Royaume-Uni
- Expérience à la clinique pour enfants à Londres
- Prévention et poursuite au Royaume-Uni



**INTEGRATE
BRISTOL**


F→RWARD
Safeguarding rights & dignity

fgm
national
clinical group

 **Equality Now**
A just world for women and girls.

Daughters of Eve
"Working to protect and empower girls and young women"

Programme de prévention des MGF



« Passeport sur les MGF » (FGM Passport) du Home Office

« La mutilation génitale des femmes (MGF) est une pratique extrêmement nocive qui a des conséquences dévastatrices pour la santé des filles et des femmes... »

A Statement Opposing Female Genital Mutilation

February 2014

HM Government

Warbixin Ka soo horjeedda Gudniinta Dumarka

Febraayo 2014

HM Government

ሴት ልጅ መግረዝን የሚጸረር መግለጫ

ፌብሩዋሪ 2014

HM Government

بيان يعارض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

فبراير 2014

HM Government

بیانیہ ای در مخالفت با ختنه خانمها

فوریه ۲۰۱۴

HM Government

Rôle du professionnel de la santé

- Nous devons demander...
- Enregistrement de la naissance
- Savoir qui est à risque
- Stratégie des arrondissements pour la prévention

Cas récent d'un médecin en formation en 2015

<https://bererblog.wordpress.com>

- MGF de type 3 en Somalie
- Désinfibulation avant la grossesse
- Nov. 2012 – accouchement par ventouse et épisiotomie avec petite incision dans une bande de tissu cicatriciel antérieur cachant l'urètre et empêchant la cathétérisation
- Une seule suture a été au cœur d'une affaire de poursuite pour prouver la MGF
- Le jury a pris moins de 5 minutes pour acquitter l'accusé

2 affaires de poursuites déboutées en 2018



Aperçu

- Contexte et types de MGF
- Prévalence dans le monde et au Royaume-Uni
- Expérience à la clinique pour enfants à Londres
- Prévention et poursuite au Royaume-Uni

Merci!